


IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA



- Este protocolo se inicia no momento da punção do acesso venoso periférico na paciente antes do parto. Os testes serão conduzidos sequencialmente a partir da amostra de soro encaminhada ao laboratório. Dentro de até 12hs, os resultados do teste rápido e VDRL (quando necessário) serão disponibilizados.
- 1* Fazendo-se necessário um terceiro teste, a depender do histórico sorológico da paciente durante o pré-natal, o médico assistente será comunicado para acompanhamento do caso.
- 2* Os resultados positivos serão comunicados para a enfermeira responsável pela ala em que a paciente se encontra e onde o laudo será impresso, e também para a CCIH e demais envolvidos com o protocolo.

A enfermeira irá comunicar o médico da paciente sobre o resultado final ou em andamento (aguardando terceiro teste). O médico responsável pela paciente irá se encarregar das orientações à paciente quanto ao tratamento/acompanhamento e de parceiros.

- Os recém-nascidos de mães positivas devem seguir o Protocolo Institucional de Sífilis Congênita.

Este protocolo é Institucional e foi montado pela equipe médica da CCIH, Dr. Mario Macoto, Dr. Rodrigo Buzzini, Dr. Carlos Barbaro, equipe Laboratorial e equipe de enfermagem dos setores envolvidos

Interpretação de testes maternos e RN e conduta

Teste rápido (treponêmico)	Teste não treponêmico VRDL/RPR		Interpretação	Conduta
	Materno	RN		
positivo	positivo	positivo	<ul style="list-style-type: none"> • Possível infecção congênita ; checar tratamento materno; 	Seguir fluxograma de investigação do RN;
positivo	positivo	negativo	<ul style="list-style-type: none"> • Infecção congênita pouco provável. 	Seguir fluxograma de investigação do RN;
positivo	negativo	negativo	<ul style="list-style-type: none"> • Infecção pregressa já tratada- 1 • Infecção materna recente com VDRL ainda negativo- 2 • Teste rápido treponêmico falso positivo (TR positivo/ VDRL negativo / terceiro teste (treponêmico) negativo)- 3 	Checar exames do pré-natal: 1* Se sífilis materna pregressa tratada, encerrar o caso para o RN e orientação para os pais. 2* Sem histórico materno ou tratamento incompleto, o RN será investigado 3* Nenhuma conduta

OBS: 3º Teste será realizado pelo Laboratório e caso não tenha sido disponibilizado antes da alta hospitalar, o resultado deverá ser retirado pela Internet: www.hmsj.com.br

Este protocolo é Institucional e foi montado pela equipe médica da CCIH, Dr. Mario Macoto, Dr. Rodrigo Buzzini, Dr. Carlos Barbaro, equipe Laboratorial e equipe de enfermagem dos setores envolvidos